

A GRIPE TEM TRATAMENTO

Devem ser tratados imediatamente com fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) os doentes com:

1 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

- indivíduos de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresentem dispnéia.

2 SÍNDROME GRIPAL E QUE:

- sejam gestantes em qualquer idade gestacional;
- tenham doença crônica, especialmente doença respiratória, cardiopatia, obesidade mórbida, diabetes descompensado, síndrome de down, imunodeficiência e imunodepressão;
- tenham 60 anos ou mais;
- sejam crianças com menos de dois anos;
- sejam indígenas.



SÍNDROME GRIPAL: indivíduos maiores de 6 meses de idade que apresentem febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia. No caso de crianças menores de 6 meses de idade: febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios.

3 EM LOCAIS COM CIRCULAÇÃO DO VÍRUS INFLUENZA A (H1N1) OU CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA:

Os doentes com síndrome gripal, mesmo sem fatores de risco, devem ser tratados conforme indicação clínica.

ATENÇÃO !



- Deve-se iniciar o tratamento imediatamente na suspeita clínica, sem necessidade de exame laboratorial ou aguardar sinais de agravamento.
- Monitorar o doente e, diante de sinais de agravamento, encaminhar à hospitalização.
- Considere o uso de antibiótico para todo caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Tabela de dosagem por peso e frequência diária

PESO CORPORAL	DOSE	TRATAMENTO EM 5 DIAS
Menor ou igual a 15kg	30 mg	12/12h 5d
Maior que 15 a 23kg	45 mg	12/12h 5d
Maior ou igual a 23 a 40kg	60 mg	12/12h 5d
Maior que 40 kg, adultos e gestantes	75 mg	12/12h 5d

O que deve ser notificado:

- Síndrome Respiratória Aguda Grave
- Surtos de Síndrome Gripal em comunidades fechadas
- Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave

CONTATOS

Em caso de dúvidas ligue 155, envie um e-mail para notifica.se@saude.mg.gov.br ou acesse gripe.saude.mg.gov.br

